

मैग्नीशियम (Magnesium) के साथ नहीं लेनी चाहिए ऐसी 13 दवाएँ / supplements



1. एंटीबायोटिक्स (Tetracycline, Ciprofloxacin)

- 👉 **समस्या:** दवा का असर बंद हो जाता है
- 👉 मैग्नीशियम दवा के साथ चिपक जाता है, जिससे दवा शरीर में absorb ही नहीं होती।
- 👉 यह “क्लंप” बन जाता है जो शरीर नहीं ले पाता → infection ठीक नहीं होता

2. थायरॉयड की दवाएँ (Levothyroxine)

- 👉 **समस्या:** दवा का असर कम
- 👉 मैग्नीशियम दवा को शरीर में पहुंचने से रोक देता है।
- 👉 दवा का level disturb हो जाता है → थकान, वजन बढ़ना हो सकता है

3. हड्डियों की दवाएँ (Bisphosphonates – Alendronate)

- 👉 **समस्या:** दवा absorb नहीं होती
- 👉 मैग्नीशियम के कारण दवा पेट से खून में नहीं जाती।”

4. गैबापेंटिन (Gabapentin – nerve pain medicine)

- 👉 **समस्या:** असर कम हो जाता है
- 👉 मैग्नीशियम दवा को शरीर में absorb होने से पहले रोक देता है।

5. डाययूरेटिक्स (पानी की गोलियाँ)

- 👉 **समस्या:** शरीर में मैग्नीशियम कम या ज्यादा हो सकता है
- 👉 कुछ दवाएँ मैग्नीशियम को शरीर से निकाल देती हैं, कुछ उसका level बढ़ा देती हैं।

6. ब्लड प्रेशर की दवाएँ

👉 समस्या: BP बहुत ज्यादा कम हो सकता है

👉 मैग्नीशियम खुद BP कम करता है, और दवा के साथ मैग्नीशियम लेने से BP बहुत गिर सकता है।

7. कैल्शियम सप्लीमेंट

👉 समस्या: दोनों का absorption कम होता है।

👉 दोनों एक-दूसरे से compete करते हैं → शरीर ठीक से नहीं ले पाता।

8. जिंक (Zinc) सप्लीमेंट

👉 समस्या: absorption कम होता है।

👉 जिंक और मैग्नीशियम एक ही रास्ते से शरीर में जाते हैं → एक दूसरे को रोकते हैं।

9. प्रोटॉन पंप inhibitors (PPIs – acidity की दवाएँ)

👉 समस्या: मैग्नीशियम की कमी

👉 ये दवाएँ लंबे समय में शरीर से मैग्नीशियम कम कर देती हैं।

10. डिगॉक्सिन (heart medicine)

👉 समस्या: toxicity का खतरा

👉 मैग्नीशियम दवा के असर को बदल सकता है और साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं।

11. पेनिसिलामाइन (Penicillamine)

👉 समस्या: दवा बेअसर हो सकती है

👉 मैग्नीशियम इस दवा को absorb होने से रोकता है।

12. डायबिटीज की दवाएँ

👉 समस्या: शुगर नियंत्रण में बदलाव

👉 मैग्नीशियम sugar metabolism को बदल सकता है, जिससे दवा का असर भी प्रभावित हो सकता है।

13. एंटीवायरल (कुछ HIV दवाएँ)

👉 समस्या: दवा ठीक से काम नहीं करती

👉 मैग्नीशियम दवा को शरीर में absorb होने से रोक सकता है।

Magnesium क्यों समस्या करता है?

मैग्नीशियम 3 मुख्य तरीकों से दवाओं को प्रभावित करता है:

1. ❌ दवा के साथ चिपककर दवा को बेअसर कर देता है (Chelation effect)

👉 जैसे: एंटीबायोटिक्स, थायरॉयड दवा

👉 मैग्नीशियम, दवा के साथ मिलकर एक ऐसा कण बना देता है जिसे शरीर absorb नहीं कर पाता।

2. ⚖️ दवा का level बदल देता है

👉 कभी असर कम, कभी ज्यादा

👉 दवा शरीर में कम या ज्यादा हो जाती है → इलाज गड़बड़ हो जाता है

3. + दवा का असर बढ़ा देता है

👉 जैसे BP medicines

👉 दोनों मिलकर एक ही काम करते हैं → BP बहुत गिर सकता है

4. ▼ शरीर से magnesium कम या ज्यादा कर देता है

👉 जैसे diuretics, PPIs

👉 कुछ दवाएँ magnesium बाहर निकाल देती हैं या जमा कर देती हैं

 Patients के लिए Practical advice (Take home message)

✓ Magnesium और दवा साथ में न लें: magnesium और दवाएँ अलग-अलग समय पर लें।

👉 ✓ कम से कम 2-4 घंटे का gap रखें

✓ दवा हमेशा पानी के साथ लें

✓ मल्टीविटामिन/antacid में भी magnesium होता है → label देखें

Dr. Megha Sharma

Associate Professor

Department of Pharmacology

R. D. Gardi Medical College

Surasa, Ujjain, MP, India

डॉ मेघा शर्मा

सह - प्राध्यापक

औषध विज्ञान विभाग

आर. डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज

सुरसा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत